

PERVINOX[®]

ANESTÉSICO

LIDOCAINA CLORHIDRATO
CLORURO DE BENZALCONIO



INDUSTRIA ARGENTINA
Venta Libre

Antiséptico - Anestésico - Alivio del Dolor

Previene infecciones de la piel, de heridas menores, raspaduras y quemaduras.

LIDOCAINA CLORHIDRATO 2.5 G
CLORURO DE BENZALCONIO 0.13 G
Solución Tópica en Spray

Fórmula

Cada 100 ml de solución tópica en spray contiene: Lidocaína Clorhidrato 2.50 g, Cloruro de Benzalconio 0.13 g. Excipientes: edetato de sodio, octoxinol 9, fosfato dibásico de potasio, propilenglicol, esencia de eucalipto, agua destilada c.s.

Este medicamento es Libre de Gluten.

Indicaciones

Para prevenir infecciones de la piel. Alivio del dolor y picazón por picaduras de insectos, heridas menores, raspaduras y quemaduras.

Posología

Adultos y niños mayores de 2 años: Limpiar la zona afectada y aplicar una pequeña cantidad de PERVINOX[®] ANESTÉSICO, 1 a 3 veces por día. Puede cubrirse el área con un vendaje estéril. Antes de aplicar el vendaje, dejar secar la superficie.

Acción Farmacológica

La Lidocaína tiene acción anestésica local, la absorción es rápida a través de las membranas mucosas y aumenta cuando se aplica sobre piel traumatizada o erosionada.

El Cloruro de Benzalconio es un agente tensioactivo poseedor de acciones detergentes, emulsificantes y antisépticas sobre un gran número de bacterias y hongos, facilitando la dispersión de otros principios activos y su contacto con la epidermis.

Acción Terapéutica

Antiséptico-anestésico.

Acciones Colaterales y Secundarias

Ocasionalmente rush cutáneo, urticaria o angioedema por reacción alérgica a la lidocaína.

Precauciones y Advertencias

En caso de heridas profundas o punzantes, mordeduras y/o picaduras de animales o quemaduras serias, consultar al médico.

Consultar inmediatamente al médico si las molestias persisten o se agravan.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a los principios activos. No usar en los ojos ni aplicar en grandes superficies de la piel. No utilizar el medicamento más de una semana a menos que el médico indique lo contrario. No utilizar grandes cantidades del producto, particularmente sobre superficies escoriadas o ampolladas.

Importante:

En caso de sobredosis accidental, consulte inmediatamente al médico o póngase en contacto con:

- Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez: Tel.: (011) 4962-6666 / 2247
- Hospital Dr. Alejandro Posadas: Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777
- Hospital General de Agudos J. A. Fernández: Tel.: (011) 4808-2655.
- Centro de Asistencia Toxicológica La Plata: Tel.: (0221) 451-5555

Presentaciones

Pervinox® Anestésico (Spray): Envases con bomba por 40 y 60 ml.

**MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS ALEJADOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
NO EXPONER A TEMPERATURAS MAYORES DE 30° C.
ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO.**

Especialidad Medicinal Autorizada
por el Ministerio de Salud. Certificado N° 46.625
Director Técnico: Alfredo Boccardo - Farmacéutico.
Laboratorio Elea Phoenix S.A. Avenida Gral. Lemos N° 2809,
Los Polvorines, Pcia. de Buenos Aires.
Para mayor información comunicarse
con el Centro de Atención telefónica 0800-222-0818
e-mail: info@phoenix.com.ar | www.pervinox.com.ar

DIVISIÓN
PHOENIX